

CZU 632.78

GRACILARIIDELE (FAM. GRACILARIIDAE, ORD. LEPIDOPTERA) INVAZIVE DIN ROMÂNIA ȘI REPUBLICA MOLDOVA ÎN COROBORARE CU FAUNA EUROPEANĂ

OLTEANU IONI, PERJU TEODOSIEI, TIMUŞ ASEAN

¹Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, România;
² Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Summary. It presents results of research on invasive insects fam. Gracilariidae, ord. Lepidoptera recorded in parks The University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Cluj-Napoca (Romania) and The State Agrarian University of Moldova. In total there were recorded 4 genera and 8 species. The most aggressive and impact on host-plants is *Cameraria ohridella*. Species that are intensive development, but without exceeding the limits dangerous to host-plants are *Ph. issiki*, *Ph. platani* and *P. robiniella*. In database Fauna Europea for Romania contains all species, and for Republic of Moldova is indicated only one species (*C. roscipennella*), but actually we recorded as present other five species (*C. ohridella*, *P. robiniella*, *Ph. robiniella*, *Ph. issiki*, *Ph. plane*).

Key words. Gracilariidae, invasive, Romania, Republica Moldova.

INTRODUCERE

Colaborarea disciplinelor entomologice de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca cu Universitatea Agrară de Stat din Moldova continuă de peste 20 ani. Cele mai bune rezultate sunt obținute și domeniul cercetărilor speciilor de insecte care se dezvoltă pe diferite plante agricole și ornamentale din ambele țări. În acest context în lucrare sunt prezentate rezultatele cercetărilor multianuale a speciilor de insecte din familia Gracilariidae, ord. Lepidoptera cu statut de invazive în coroborare cu baza de date a Faunei Europene (FaEu).

METODE ȘI MATERIALE

Cercetarea gracilariidelor s-a efectuat pe baza materialului biologic foliar al speciilor de plante ornamentale (în tabel: planta-gazdă) recoltate din parcurile ambelor universități. Frunzele cu simptomele de atac s-au recoltat în perioada de vegetație și au fost examineate cu binocularul MBC-9. Identificarea speciilor de insecte s-a efectuat conform determinatoarelor clasice. Rezultatele obținute au fost corroborate cu baza de date a Faunei Europene. Baza de date a Faunei Europene a fost aplicată pe rol de martor, după modelul testărilor produselor pentru uz fitosanitar.

REZULTATE ȘI DISCUȚII

Peste 15 ani colectivul ambelor discipline entomologice permanent cercetează entomofauna invazivă care se dezvoltă pe plantele ornamentale din parcule universităților, care, merită de-a menționa că este foarte bogată din punct de vedere botanic, respectiv și entomologic.

Prima specie care a provocat cercetarea comună a fost *Cameraria ohridella* ce atacă castanu și continuă să se dezvolte agresiv, provocând defolieri totale la sfârșitul lunii iulie în fiecare an. Investigațiile continuă pe salcâm (*Parectoma robiniella*, *Phyllonorycter robiniella*), platani (*Phyllonorycter platani*), tei (*Phyllonorycter issiki*) etc. Speciile depistate sunt corroborate cu baza de date a Faunei Europeană, fiindcă aceasta este un standard pentru tot universul științific entomologic și în comparație cu țările vecine (Ucraina, Bulgaria, Polonia) și Rusia, fiindcă relațiile economice cu această țară sunt foarte intensive cu România și Republica Moldova.

Rezultatele obținute sunt prezentate în tabelul din continuare.

Din rezultatele prezentate în tabel se observă că gracilariidele invazive sunt din 4 genuri (*Caloptilia*, *Cameraria*, *Parectopa*, *Phyllonorycter*), iar cele mai multe ca număr sunt din genul *Phyllonorycter*.

Din punct de vedere al impactului menționăm că doar specia *C. rosipennella* se dezvoltă pe planta agricolă *Juglans* sp., dar impactul este nesemnificativ, fiindcă se dezvoltă doar faunistic. Celelalte specii de insecte invazive se dezvoltă pe unele plante ornamentale, care au mare importanță ecologică pentru parcurile universităților, orașelor etc. și anume: *Rhododendron*, *Aesculus*, *Robinia*, *Tilia*, *Platanus*, *Crataegus*.

Originea gracilariidelor este diversă și anume: asiatică (genul *Caloptilia* spp., *Phyllonorycter issiki*), nord-americane (*Parectopa robiniella*, *Phyllonorycter robiniella*), mediterane (*Phyllonorycter platani*, *Phyllonorycter leucographella*) și balcanice (*Cameraria ohridella*). După cum se observă din America de Nord au pătruns pe continentul European două specii de gracilariide din două genuri (*Parectopa robiniella*, *Phyllonorycter robiniella*), dar pe aceeași plantă-gazdă *Robinia pseudoacacia*. Aceasta fiindcă salcâmul, la fel, este o plantă invazivă de pe continentul respectiv, fiind înregistrată în Europa pentru prima peste 370 de ani în urmă (Britania, 1636).

Perioada pătrunderii pentru toate speciile este recentă, sau din ultimii 50 de ani (1950-2000) și ultrarecentă, sau din ultimii 12 ani (2001-2013).

Gracilariidele înregistrate și expuse în această lucrare au fost corroborate cu baza de date a Faunei Europene și menționăm că pentru toate speciile se indică ca prezente în Europa. Aceeași situație este și pentru România sau toate gracilariidele sunt indicate ca prezente. Referitor la Republica Moldova, observăm că este indicată doar o specie (*C. rosipennella*), iar pentru celelalte se menționează ca „no date”. În realitate noi am înregistrat 5 specii (*C. ohridella* din 2003, *Ph. platani* din 2006, *Ph. robiniella* din 2006, *P. robiniella* din 2009, *Ph. issiki* din 2011) și le anunțăm ca prezente și în Republica Moldova. Pentru Polonia în Fauna Europeană se indică 4 specii de gracilariidele ca „absente”, ori în lucrarea lor de referință sunt indicate ca „prezente” aceste specii și anume: *Parectopa robiniella* din 1993, *Caloptilia rosipennella* din 1996, *Phyllonorycter robiniella* din 2003, *Phyllonorycter issiki* din 2007. Speciile de insecte invazive din Ucraina și Rusia sunt menționate doar conform bazei de date a Faunei Europene, neavând o lucrare de referință după modelul Bulgariei (2009) și Poloniei (2011).

Tabelul 1. Gracilariidele (fam. Gracilariidae, ord. Lepidoptera) invazive din România și Republica Moldova

Specia	Impactul	Planta-gazdă	Originea	Pătrundere	FaEu	România	Moldova	Ucraina	Polonia	Bulgaria	Rusia
<i>Caloptilia</i>											
<i>C. rosipennella</i> Hübner, 1796	IA	monofag: <i>Juglans</i> sp.	T: Asia de Sud Est	R	prezent	FaEu - prezent;	FaEu - prezent;	FaEu - prezent;	FaEu - absent; 1996	FaEu - prezent;	FaEu - prezent, no date;
<i>C. (Gracilaria) azaleella</i> Brants, 1913	IO	monofag: <i>Rhododendron</i> <i>simisii</i> , sere	T: Asia, Japonia	UR	prezent: UK - 2011	FaEu - prezent;	FaEu - no date;	FaEu - absent;	FaEu - absent;	FaEu - prezent;	FaEu - prezent, no date;
<i>Cameraria</i>											
<i>C. ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	IO	monofag: <i>Aesculus</i> <i>hipocastanum</i>	R: Mediterană, Macedonia	R	prezent	FaEu - prezent; 1996	FaEu - no date; 2003	FaEu - prezent;	FaEu - prezent; 1993	FaEu - prezent; 1998	FaEu - no date;
<i>Parectopa</i>											
<i>P. robinella</i> Clemens, 1863	IO	monofag: <i>Robinia</i> <i>pseudocacia</i>	T: America de Nord	UR	prezent	FaEu - prezent; 2009	FaEu - no date; 2009	FaEu - prezent;	FaEu - absent; 1993	FaEu - prezent; 2000	FaEu - no date;
<i>Phyllonorycter</i>											
<i>Ph. robinella</i> Clemens, 1859	IO	monofag: <i>Robinia</i> <i>pseudocacia</i>	T: America de Nord	R	prezent	FaEu - prezent; 2009	FaEu - no date; 2006	FaEu - prezent;	FaEu - absent; 2003	FaEu - prezent; 2000	FaEu - no date;
<i>Ph. issikii</i> Kumata, 1963	IO	monofag: <i>Tilia</i> spp.	T: Asia, Japonia	R	prezent	FaEu - prezent; 2009	FaEu - no date; 2011	FaEu - prezent;	FaEu - absent; 2007	FaEu - prezent; 1996	FaEu - prezent, no date;
<i>Ph. platani</i> Staudinger, 1870	IO	monofag: <i>Platanus</i> <i>orientalis</i>	UR: Or.apr, P.Balcanică	R	prezent	FaEu - prezent;	FaEu - no date; 2006	FaEu - prezent;	FaEu - prezent; 1989	FaEu - prezent;	FaEu - no date;
<i>Ph. leucographella</i> Zeller, 1850	IO	monofag: <i>Crataegus</i> <i>azarolus</i>	R: Mediterana	UR	prezent	FaEu - prezent; 2009	FaEu - no date;	FaEu - absent;	FaEu - prezent;	FaEu - no date;	FaEu - no date;

Legenda: IA - impact agricol; IO - impact ornamental; T - transcontinental; R - regional; UR - ultra region

CONCLUZII

1. Conform cercetărilor din domeniul speciilor de insecte invazive din familia Gracillariidae, ord. Lepidoptera înregistrate în parcurile Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca (România) și Universitatea Agrară de Stat din Moldova (Republica Moldova) au fost înregistrate 4 genuri (*Caloptilia*, *Cameraria*, *Parectopa*, *Phyllonorycter*) și 8 specii (*Caloptilia roscipennella*, *C. azaleella*, *Cameraria ohridella*, *Parectopa robiniella*, *Phyllonorycter robiniella*, *Ph. issiki*, *Ph. platani*, *Ph. leucographella*).
2. Cea mai agresivă și cu mare impact ecologic asupra plantelor-gazdă este *Cameraria ohridella*, care provoacă uscarea și căderea aparatului foliar începând cu sfârșitul lunii iulie, iar unii arbori în totalitate rămân fără frunze.
3. Speciile care se dezvoltă intensiv, dar fără depășirea unor limite periculoase pentru plantele-gazde sunt *Ph. issiki*, *Ph. platani* și *P. robiniella*.
4. În baza de date a Faunei Europeană toate graciliidele cercetate de noi sunt indicate ca prezente, inclusiv pentru România. Referitor la Republica Moldova este indicată doar specia *Caloptilia roscipennella*), în realitate fiind înregistrate ca prezente 5 specii: *Cameraria ohridella*, *Parectopa robiniella*, *Phyllonorycter robiniella*, *Ph. issiki*, *Ph. platani*.
5. Specia *Ph. leucographella* cu planta-gazdă *Crataegus azarolus* prezintă neclaritate pentru Republica Moldova, fiindcă a fost înregistrată în mai amulte țări din Europa, inclusiv în România și Bulgaria, astfel există posibilitatea de-a fi depistată și pe vegetația noastră, doar că sunt necesare investigațiile de rigoare.

BIBLIOGRAFIE

1. DOMBI, Ö. P., OLTEAN, I., FLORIAN, Teodora, VARGA, M. Monitoring the Attack by Parectopa robiniella and Phyllonorycter robiniella on Trees From the City of Tg. Secuiesc. In: Bulletin UASVM Agriculture, /2011, 68 (1), p. 406.
2. DOMBI, PAL ORS, OLTEAN, I., Florian TEODORA, BODIȘ ILONKA, VARGA, M. Molile miniere ale salcâmului semnalate în localitatea Covasna, Agrobuletin AGIR, nr.6/2010, Timișoara, p. 43-47.
3. KOSIBOWICZ, M. Parectopa robiniella Kumata 1963. In: Gatunki obce w faune Polski/Alien species in the fauna of Poland. Krakow: Institut Ochrony Przyrody PAN, 2011. p. 241-342.
4. KOSIBOWICZ, M., PAWOWSKI, J., Cameraris ohridella Desc. et Dimic, 1986. In: Gatunki obce w faune Polski/Alien species in the fauna of Poland. Krakow: Institut Ochrony Przyrody PAN, 2011. p. 336-340.
5. MIHAILOV, Irina, Molia minieră a castanului a ajuns la Chișinău. In: Ora Satului, 2004, nr. 11, p. 4.
6. NEȚOIU, C., TOMESCU, R. (2006). The leaf miners of black locust (Parectopa robiniella Clemens - 1863 and Phyllonorycter robiniella Clemens 1859, Lepidoptera, Gracillariidae, Analele ICAS, 49, p. 119-131.
7. Oltean I., Lucia Gânsă, T. Perju, §.a., Biopesticid feromonal utilizat în combaterea ecologică a moliei miniere Cameraria ohridella Deschka et Dimic, dăunător major al castanului sălbatic (ornamental), In: Protecția plantelor, anul XV, 2005, nr. 59-60, p. 74-81.
8. PERJU, T., OLTEAN, I., Maria MONICA PORCA, OPREAN, I. New aspects concerning the integrated control of the horse chestnut leaf-miner Cameraria ohridella. In: Buletin UASMV- CN, A, 60/2004, p. 132-137.
9. PERJU, T., Molia minieră a castanului oriental (C. ohridella). In: Sănătatea plantelor, 2001, nr. 7, p. 38.
10. PERJU, T., OLTEAN, I., OPREAN, I., Monica ECOBICI. The pest of horse chestnut tree - *Aesculus hippocastanum* L. in Romania. In: Central European Agriculture, 2004, vol. 6, nr. 4, p. 331-336.
11. SEFROVA, H. Phyllonorycter issikii - the latest information on a new member of our fauna. Abstract of a paper presented at a Conference on Zoology, 2002, p. 15.
1. TIMUŞ, Asea, DERJANSCHI, V., MANIC, GH., MIHAILOV, I., PERJU, T. Speciile de paraziți care se dezvoltă pe molia minieră a castanului Cameraria ohridella în R. Moldova. În: Realizări și perspective în horticultură, viticultură, vinificație și silvicultură. UASM. Chișinău, 2007, vol. 15(3). p. 265-268.
12. TIMUŞ, Asea, Irina MIHAILOV, Evoluția moliei miniere a castanului Cameraria ohridella în Republica Moldova. In: Acta Universitas Cibiniensis, seria Științe Agricole, vol. 1, nr. 15(5), 2005, p. 358-364.
13. TIMUŞ Asea, Molia minieră a acastanului a ajuns și la Chișinău. In: Fermierul, 2003, nr. 106, p. 3.
14. TIMUŞ Asea, N. Croitoru, V. Derjanschi, Irina Mihailov, Factorii abiotici (temperatura și umiditatea) și acțiunea acestora asupra moliei miniere a castanului Cameraria ohridella. Chișinău: UASM, 2007, 7 p.
15. АНДЮХОВА, О. В. Белоакациская моль-пестрянка (Parectopa robiniella Clemens - 1863) – опасный вредитель Robinia pseudoacacia L. в Преднистровье. В: Известия Санкт-Петербургской Академии, вып. 192, 2010, с. 4-11.
16. Держанский, В., ТИМУШ, Ася, Куртян, Татьяна Развитие платановой минирующей моли-пестрянки Phyllonorycter platani St. (Lth., Gracillariidae) в Республике Молдова. В: Материалы Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы в защите растений», 2010, с. 20-22.
17. ЕРМОЛАЕВ, И. В., ЕФРЕМОВА, З. А., ИЖБОЛДИНА, Н. В. Факторы смертности липовой моли-пестрянки Phyllonorycter issikii Kumata (Lepidoptera, Gracillariidae) в Удмуртии. В: Известия Санкт-Петербургской

Лесотехнической Академии, вып. 192, 2010, с. 93-101.

18. ЕРМОЛАЕВ, И. В., ЗОРИН, Д. А. Анализ фитосанитарного риска липовой моли-пестрянки. В: Защита и Карантин растений, 2011, №10. с. 28-29.

19. ЕРМОЛАЕВ, И. В. Мотошкова Н. В. Липовая моль-пестрянка. В: Защита и Карантин растений, 2007, №5. с. 40-41.

20. ПОДОЛЯЦКАЯ, Ю. С., МЯСНИКОВА, А. В. Вредители липы в насаждениях г. Санкт-Петербурга. В: Известия Санкт-Петербургской Лесотехнической Академии, вып. 192, 2010, с. 201-208.

21. ТОМОВ, Р., ТРЕНЧЕВА, К., ТРЕНЧЕВ Г., ЗОТА, Е., RAMADHI, А., ИВАНОВ, Б., НАЧЕСКИ, С., ПАПАЗОВА-АНАКИЕВА И., KENIS, M. Чуждоземните насекоми и заплахата от тях за биоразнообразието и икономиката на Албания, България и Република Македония. София: PENSOFT, 2009, 35-36 с.