

SOLUȚII ORALE UTILIZATE ÎN TRATAMENTUL GINGIVITELOR

Andreea Bajureanu, Diana Uncuța
Catedra de propedeutică stomatologică
„Pavel Godoroja”, USMF „Nicolae Testemițanu”

Introducere. Maladia gingivală poate fi cauzată de acumularea plăcii bacteriene orale. Dacă bacteriile nu sunt îndepărtate prin periaj dentar și folosirea regulată a aței dentare, acestea pot irita gingiile, provocând înroșirea, inflamarea și sângerarea lor. Acestea sunt simptomele timpurii ale bolii gingivale, numită gingivită.

Scopul. Scopul acestui studiu este de a revizui literatura de specialitate stomatologică și a prezenta cunoștințele actuale cu privire la aspectele tehnice și clinice ale diferitelor soluții orale, a remediilor de evidențiere a plăcii bacteriene și a tratamentului gingivitei.

Materiale și metode. În cadrul studiului am selectat un eșantion de 10 pacienți cu vârsta cuprinsă între 15-30 ani. Au fost aplicați revelatori de placă cu Eritrozina. S-a efectuat clătire orală cu apă sau utilizarea spray-ului de apă pentru îndepărtarea depozitelor moi, a resturilor alimentare, a surplusului de colorant. Aprecierea gradului de colorare. Îndepărtarea colorantului prin periaj profesional cu paste profesionale orale. S-au utilizat soluții orale variate pentru eficientizarea igienei cavității orale.

ORAL SOLUTIONS USED IN THE TREATMENT OF GINGIVITIS

Andreea Bajureanu, Diana Uncuța
Department of dental propaedeutics
„Pavel Godoroja”, „Nicolae Testemițanu” SUMPh

Introduction. Gum disease can be caused by the build-up of oral bacterial plaque. If the bacteria are not removed by regular brushing and flossing, they can irritate the gums, causing them to become red, inflamed and bleed. These are the early symptoms of gum disease, called gingivitis.

Objective of this study is to review the dental specialty literature and present the current knowledge regarding the technical and clinical aspects of different oral solutions, remedies for bacterial plaque exposure and treatment of gingivitis.

Materials and methods. In the study we selected a sample of 10 patients aged between 15-30 years. Plaque developers with Erythrosine were applied. Oral rinsing with plain water or use of water spray was performed to remove soft deposits, food debris, excess dye. Appreciation of the degree of coloring. Removal of the dye by professional brushing with professional oral pastes. Various oral solutions have been used to improve the hygiene of the oral cavity.

Rezultate. S-a constatat că utilizarea revelatorilor de placă duc la îmbunătățirea evidențierii plăcii bacteriene și îndepărtarea ei prin periaj profesional pentru a preveni apariția bolii gingivale. Utilizarea soluțiilor orale a condus la un rezultat evident de îndepărtare a mirosului neplăcut din cavitatea orală și o respirație mai proaspătă.

Concluzie. Utilizarea revelatorilor de placă orală, a apelor de gură, detartrajul și periajul profesional duc la o reducere semnificativă a bolii gingivale. Este nevoie de conștientizarea pacienților și motivarea acțiunilor de igienizare profesională a cavității orale și de îndepărtare a factorilor favorizanți a depunerii de placă bacteriană dentară.

Results. The use of plaque revealers has been found to improve plaque exposure and removal through professional brushing to prevent gum disease. The use of oral solutions led to an obvious result of removing the unpleasant odor from the oral cavity and fresher breath.

Conclusion. The use of oral plaque removers, mouthwashes, scaling and professional brushing lead to a significant reduction in gum disease. There is a need to raise awareness among patients and to motivate the actions of professional hygiene of the oral cavity and the removal of the factors favoring the deposition of dental plaque.